

OMtp666

3615 OMtp666

Malvasia bianca

Vass7R04s311-315



dontodontodontodontod



ANNEE 1991

MOM Malvasia bianca EMPLACEMENT 7 Rg 4 1 311.315

	~	
1	n	
60	-	

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		ment Nbre Ferti- /déb grap lité		Flo. début	Floraison debut mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité
2/3	2	15,5	18.5.	1	3							
5		15,5 L 18.			Grappe Pour : Baie : Couleur Saveur Pépins Port :	disc-s	sph-ell sr-Rs-I	l-ov-o Rg-N c - fo yrène	bov-cy Jus ox - he	vl-fus : inc erb	- cc	L - M ©

ANNEE 1992

NOM Mahasia bianea EMPLACEMENT 7 kg 4 s 311.315

Souche	Nbre yeux	Débou début	ébourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin												
1 2	f 2	16,3	19,3 *		2 Cranno						1				
5		16.3 16.3 16.3 -1			Grappe: G - M - P Dim : 7 Compacité: L - M - C Pour : Mill : 1 Baie: TG - G - M - P Dim : 16 X I disc-sph-11 ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg-N Jus: Ind - coloré Saveur: S - m - ar - fox - herb Pépins: avec - apyrène Port: My Gueur: 15										
					•										

ANNEE 1993														
NOM Halvasice bianca. EMPLACEMENT 7 R49-311.315														
Aust. 8.82. ni														
Souche	Nbre Débourrement Nbre Ferti- Floraison Véraison yeux début mi/déb grap lité début mi/f fin début mi/v fin Maturi									Maturité				
1 8														
×														
3	2	16,3	183 .	0	Grappe	: G	M - P	Dim	/	Compa	cité	: L - M- C		
4 8					Pour :		Mil	1/						
5	2	16.3	19.3 ~	0	Bale:	TC - 0 disc-sp	h-ell	- P <u>l</u>	Dim:	l-fus				
					Couleu	r : B-0	r-Rs-	Rg-N	đus :	inc -	- col	Loré		
	De.	18,3,0	13		Saveur Pépins	/			ox - he	erb				
		-2			Pépins / avec - apyrène Port : Vigueur :									
-		g*												

AMNEE: 1994 NOM Malvasia bianca EMPLACEMENT 7 Ry & 311.315 ni. Souche Nbre Débourrement Nbre Ferti-Floraison Véraison début mi/v fin Maturité yeux début mi/déb grap début mi/f | fin lité 1031 0 2 1 n 1031 7.3 0 3 Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - 11-2.3 7.3 K Pour: Mill: 2.3 7.3 × Baie: TC - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb 1 le 7.3.94 (°) Pépins : avec - apyrène Port: Vigueur :

ANNEE: 1995 NOM Malvasia bianca EMPLACEMENT. 7 Rh & 311. 315

٧4

ouche	Whre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité	Flor début	mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1 2 3 4 5	2 2 2	No.		0	Grappe Pour: Baie: Couleu Saveur	: G disc-s r : B : s	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1: - P -ov-o Rg-N ar - f oyrène	: hov-cy <u>Jus</u> ox - h	Compa- l-fus : inc erb	cité	: L - 11- C

ANNEE: 1996 HOM Malvasia bianca EMPLACIENTENT. 7 R4 1 341. 315 m 8-82 Nore Débourrement tibre yeux début mi/deb grap Véraison Floraison Fertidebut mi/f fin debut mi/v fin Waturité iche lité. 2 28.2. O Compacité : L - H- C Grappe : G - M - P Dim : 3 21.2 × 0 Four: Mill: 1 Baie: TC - G - H - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus 5 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Dle 28.2. 96 (-17) Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Vigueur : Fort:

N° d'ordre : Désignation : Alvasia bianca 7R4 s.311-315 s.3

Emplacement :

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183) - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure: glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure: blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - autres 213 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Mervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 28 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Dimbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 283.

A pétiole glabre 237 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

Calvo 90

Malvasia bianca 7R4 s-311-3150.3

N° d'ordre : Désignation : Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côtelé. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250 ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253. : dos coloré 254 - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 257 - à raies 258 - vert 259.

: verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265. Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement: mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Malvasia bianca 7R4s-311.3154.4 N° d'ordre :

Désignation : Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 / grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145)- velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 -

sans villosité pubescente 272 - sans villosité

laineuse 273.

limbe : glabre 150 - séteux 151 velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163)- point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 171 - court 172. Glabre 173) - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 1(7) - vert 178 leglus touveul Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Calvo go

N° d'ordre : Désignation :

Emplacement :

Malvasia bianca 7 R 4 s - 311.315 s - 3

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite (dimensions 12x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 76 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré \$1.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière - irrégulière (dimensions : 15 x 15). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91. Très pruinée 92 - pruinée 93/- non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105 - coloré 106. A ombilic très apparent - pen apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 1(1) A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121) A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 129 peu apparent 129. A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 184, A peau fine 1(35) - moyenne 136 - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pépins - apyrène.

Caloge

Formulaire de description 6/8 (après chute des feuilles)

Année 2003

Observateur

Code cépage Code clone Nom cépage Malvasia bianca

Emplacement: 7 Russu- 315

Sarment

oiv 101 section transversale : circulaire 1 - elliptique 3 - aplatie 5. oiv 102 surface : unie 1 - côtelée 2 - striée

oiv 103 couleur générale : jaune 1 - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4

oiv 104 lenticelles : absentes() - présentes 9

oiv 105 densité des poils dressés des noeuds : absence 7 - présence 9. oiv 106 densité des poils dressés des entrenoeuds absence présence

oiv 353 longueur entrenoeuds: très courts (-60mm) & -courts (90mm) 3 - moyens (120mm) 5 longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9. 60 oiv 354 diamètre entrenoeuds: très petit (5mm) () petit (8mm) (6 moyen (11mm) 5 - grand (14mm) 7 - très grand (-17mm) 9

Porte-greffe

oiv 551 rendement en bois/ha : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9. oiv 552 formation de cal de soudure : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élecé 7 - très élevé 9. oiv 553 aptitude à la rhizogenèse très faible 1 - faible 3 - moyen 5 éleve / très élevé 9

Vassal

Noeuds: aplatis 1 - moyens@ - saillants 3

N° d'ordre :

Désignation: Malvaria bianca

Emplacement: 7 R4 4 341. 345

```
Angle des nervures
                                        : 1 - 2 - 3
Sexe
                                        : 4 - 5 - (6)
                                        : 7 -(8) - 9
L1/L
L2/L : (10 - 11)

Nombre de lobes : 12 - 13 - 14 - (15) - (16)

Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - 19 - (20)

Prof. sinus latéral Inf. : 21 - 22 - 23 - (24)

Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - (27) - (28) - 29
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : (267)
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                         : 271
                                        : 40 - 41
: 42 - 43 - 44
Dents : forme
Dents (angle)
Angle du lobe terminal : (45) - 46 - 47
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
Angle des nervures L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub> : 60 - 61 - 62
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
Dent terminale du lobe latéral supérieur
Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
```

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Rennes 92